# GSH NPK 15-3,3-13+5MgO

Napsal uživatel Hubert Plaček
Úterý, 09 Květen 2023 11:04 - Aktualizováno Úterý, 09 Květen 2023 21:24

Nové granulované směsné hnojivo s obsahem fytohormonů. Celý článek ZDE a **VIDEO.**

NOVÉ GRANULOVANÉ SMĚSNÉ HNOJIVO S OBSAHEM FYTOHORMONŮ

ÚČINNÝ POMOCNÍK PŘI OBNOVĚ NEJEN KALAMITNÍCH HOLIN

**Na český trh vstupuje nové komplexní granulované směsné hnojivo s obsahem fytohormonů s pozvolným uvolňováním živin, speciálně vyvinuté pro zajištění výživy mladých stromků na odlesněných a kalamitních plochách.**

Na odlesněných plochách po kůrovcových nebo větrných kalamitách dochází k výraznému změnám v mikroklimatu stanovišť určených pro nové zalesnění. Slunéční záření, vysoké teplotní rozdíly, možné zamokření ploch vedou k omezení transpirace a tím i ke ztrátě přirozené biodiverzity. Dochází ale také ke zrychlenému rozkladu organických látek (mineralizaci) a k výrazné ztrátě dusíku a dalších minerálních živin z následným rozvojem nitrofilní vegetace (ostružiny, vrbky, maliník atp.). Výrazně se tak zhoršují stanovištní podmínky pro členovýsadbu dřevin nebo přirozené zmlazení. Při-padné ponechání těžebních zbytků bilanci živin odvětvujících zalesnění zcela nevyrovnají.

Je proto potřebné v prvních letech po výsadbě vytvořit pro dřeviny vhodné podmínky. Dostatečnou výživu a podporu zajistí využití hnojiva s pozvolným uvolňováním dusíku a dalších živin, obsahujícího a oktetní regulátory růstu (huminové látky, kyselinu nikotinovou či naftyloctovou).

Takto koncipované složení hnojiva a jeho použití zajišťuje díky obsahu pomalu a rychleji uvolnitelných forem živin účinnost hnojiva 1–3 roky v závislosti na stanovištních podmínkách.

GSH NPK 15-3,3-13+5 MgO

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Dusík celkový jako N v % hm. | 15 |
| Dusík amonný jako N v % hm. | 4,5 |
| Dusík močovinoformaldehydový jako N v % hm. | 6 |
| Fosfor celkový jako $P_2O_5$ v % hm. | 3,3 |
| Draslík celkový jako $K_2O$ v % hm. | 13 |
| Draslík vodorozpustný jako $K_2O$ v % hm. | 13 |
| Hořčík celkový jako MgO v % hm. | 5 |
| Síra celková jako S v % hm. | 15 |
| Síra celková jako $SO_3$ v % hm. | 37,4 |
| Huminové látky v % hm. | 0,5 |
| Kyselina nikotinová v % hm. | 0,01 |
| Kyselina naftyloctová v % hm. | 0,01 |
| Částice ≤40 mm v % hm. | min. 90 |
| Částice pod 1 mm v % hm. | max. 3 |
| Částice nad 10 mm v % hm. | 0 |

**Granulované směsné hnojivo s obsahem fytohormonů dodává:**

**MERCATA LES s.r.o.**
tel.: +420 568 821 203, +420 606 716 926
e-mail: mercata@mercata.cz
www.mercata.cz

**Význam jednotlivých živin v hnojivu**

**Dusík**

Hnojivo obsahuje 4,5 % dusíku v amonné formě, zbytek tvoří močovino-formaldehydový kondenzát, který zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku do půdního roztoku.

**Fosfor**

Obsah fosforu v hnojivu je nižší z toho důvodu, že lesní stromy nevyžadují takovou akutní potřebu fosforu jako polní plodiny.

**Draslík**

Hnojivo je bezchloridové, vyšší koncentrace draslíku je potřebná z hlediska odvinění metabolických procesů během vegetace a zejména stimuluje tvorbu podpůrných pletiv (vyzrávání, zvýšení mrazuvzdornosti atp.).

**Hořčík**

Význam ovlivňuje průběh fotosyntézy, zejména tvorbu chlorofylu, čímž podporuje asimilaci $CO_2$ a enzymatické procesy během vegetačního období.

**Biologicky aktivní látky**

Do jisté míry zabraňují vzniku stresových faktorů po výsadbě na volných plochách, jako je nedostatek vody, vysoké teploty, slunění záření, výsušné větry. Fytohormony podporují zpětnými dominanci kořenového vrcholu, omezují větvení a zlepšují zdravotní stav rostlin. Huminové látky umožňují snadnější příjem živin a stimulují tvorbu kořenového systému.

*Ing. František Pošíka*
*Mercata LES s.r.o*
*Ing. Petr Šlamenda, Ph.D.*
*Lovochemie, a.s.*

*Videoreklamní zpřístupnění granulovaného hnojiva natočené na Silvarium.TV*