

CAMPOFORT® Fortestim-beta

CZ



HNOJIVO ES

Kapaln e dusikat e hnojivo N (Mg, S), 15 (5-4) se b orem, B

15,0 % (v/v) N amidick�y	vodorozpuustn�y amidick�y dus�k	194 g/l
5,0 % (v/v) MgO	vodorozpuustn�y oxid hoře�atn�y	64 g/l
4,0 % (v/v) S	vodorozpuustn�a s�ra	51 g/l
1,0 % (v/v) B	vodorozpuustn�y b�r v komplexu s monoetanolaminem	13 g/l

V yrobce: AGRA GROUP a.s.,

Tov arn  9, 387 15 Střelsk e Hořtice, Czech Republic

Obsah balen : 27,3 kg • 819 kg • 1274 kg (tj. 21 litr  • 630 litr  • 980 litr )

Podm nky skladov n : Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dět  a v p vodn ch obalech. Doba pou itelnosti: **36 m s c ** od dod vky hnojiva p i dodr zen i podm nek skladov n . Hnojivo skladujte v p vodn m balen , v zastřešen e m stnosti, p i teplotě v hranici **-25 ÷ +30°C**. Maxim ln  mno stv  vrstev p i skladov n : kanystry 21 dm³ - 3 vrstvy • kontejner 1 m³ - 2 vrstvy.

Listov e hnojivo **CAMPOFORT® Fortestim-beta** se zvyřen m stimula n m u inkem je ur eno pro  asnou jarn  aplikaci v řepce ozim e a pro prv n  jarn  aplikaci v řepce jarn , cukrovce, slune nici, brukvov t  zelenině, m ku, jetelovin ch a luskovin ch. Pou iv  se formou mimokořenov  v řivy postřikem na list rostlin.

Rozsah a zp sob pou it : Hektarov  d vka: **9,1 kg / ha** (tj. 7 litr  / ha)

P i aplikaci db me těchto z sad:

1. Nepřekra ujeme doporu enou koncentraci živn ho roztoku.
2. Nestřik me p i prudk m slunci a vysok ch teplot ch; nejlepší je rann  (po sejit  rosy) nebo pozdně odpoledn  aplikace, postřik p ed deřtěm nebo za deřtě nen  u inn y.
3. Nestřik me porosty fyziologicky  i mechanicky pořkoven  nebo silně napaden  chorobami a řkudci.
4. Nestřik me porosty p ehnojen  dus kem.
5. Na p d ch s n zkou  rodnost  se u inek mimokořenov  v řivy rostlin nem že dostate ně projevit.

Doporu en  aplikace listov ho hnojiva CAMPOFORT® Fortestim-beta

Plodina	V�vojov� f�ze BBCh (BBA)	kombinace s	hektarov� d�vka hnojiva / optim. mno�stv� vody
řepka oz., slune�nice, luskoviny	12 - 31	herbicidey, insekticidey	9,1 kg (7 litr�) CF / 120 litr� ař 300 litr�
řepka jar., hoř�., zelen., vin. r�va, m�k	14 - 19		9,1 kg (7 litr�) CF / 200 litr� ař 1000 litr�
ovoce, s�ja	21 - 31	herbicidey, fungicidey, insekticidey	9,1 kg (7 litr�) CF / 200 litr� ař 600 litr�
řepa	22 - 25	herbicidey, fungicidey, insekticidey	9,1 kg (7 litr�) CF / 150 litr� ař 300 litr�

Obsah rizikov ch prvk  v hnojivu

nepřekra uje l mitn  hodnoty stanoven  vyhl škou  . 474/1000 Sb.

(Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpe nost a ochranu zdrav  p i p aci:

P i p aci s hnojivem je zak z no p t, j st, kouřit. Je t eba dodr zovat z sady osobn  hygieny, po p aci a p ed j dlem om t pokořku rukou teplou vodou a m dlem a ošetřit vhodn m repara n m kr mem.

Prvn  pomoc: P i zasařen  o i: okam itě d kladně vypl chněte vodou a vyhledejte l kařskou pomoc.

Po it : vyp t bezprostředně po po it  0,5 l vla n  vody a vyhledat l kaře.

Zasařen  pokořky: rychle opl chnout dostate n m mno stv m vody, později d kladně, ale bez velk ho mechanick ho dr žděn , om t vodou a m dlem, odložit zasařen  oděv. Ve vřech těřřich p padech, p i po it  nebo zasařen  o i v dy vyhledat l kařskou pomoc.